



Grupa Robocza do Spraw Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Przewodnicząca: prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak
Katedra i Klinika Hematologii, Terapii Komórkowych i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
tel: (71) 784 25 78, e-mail: maria.podolak-dawidziak@umw.edu.pl

Wrocław, 28.03.2025

Pani

Ewelina Matuszak

Prezes Fundacji Sanguis

Hemofilia i Pokrewne Skazy Krwotoczne

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pismo z 14.03.2025 pragnę zapewnić, że nasza Grupa uważa, że należy zapewnić najskuteczniejsze leczenie chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. Emicizumab powinien być stosowany zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego.

Szybko zdobyliśmy doświadczenia własne, ponieważ Ośrodki z Polski uczestniczyły w badaniach klinicznych z emicizumabem u chorych na ciężką hemofilię A z inhibitorem (Warszawa; publikacja Oldenburg J et al.: N Engl J Med. 2017;377:809-818) i bez inhibitora (Wrocław; publikacja Pipe S et al. Lancet Haematology 2019;6:295-305). Staraniem Grupy zostały opublikowane zasady stosowania emicizumabu u chorych na hemofilię powikłaną inhibitorem (Windyga J i wsp: J Transf Med. 2020;13:153-164).

Członkowie Grupy optują za wprowadzaniem nowoczesnego leczenia skaz krwotocznych w opiniach na zlecenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz podczas pracy w Radzie Narodowego Programu Leczenia Hemofilii i Pokrewnych Skaz Krwotocznych na lata 2024-2028.

Z wyrazami poważania,

Prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak
Przewodnicząca Grupy

Maria Podolak-Dawidziak